



GDS
Auvergne
Rhône-Alpes

Piégeage de printemps 2026 : bilan de la lutte contre le frelon à pattes jaunes



Préambule

Période propice au piégeage de printemps : entre le 01 mars et le 31 mai




The screenshot shows the homepage of the 'Frelons Asiatiques' website. The header is yellow with a logo on the left and navigation links: 'Qui sommes-nous', 'Frelon Asiatique', 'Ressources', 'Cartographie', 'Nous soutenir', 'FAQ', 'Contact', 'Connexion', and a red 'Je signale' button. The main banner features a close-up of two wasps on wood, with the text 'SIGNALEMENTS DE FRELON ASIATIQUE' and 'PLATEFORME OFFICIELLE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES'. Below this, a paragraph states the site's purpose. At the bottom of the banner, a text box says: 'Les chiffres présentés sont majoritairement issus de la plateforme régionale de déclaration : www.frelonsasiatiques.fr'.



**Le formulaire de
déclaration est ouvert
du 1er mai au 30 juin
uniquement**

Synthèse par département



Département	Nombre de captures FA	Nombre de pièges	Nombre de communes
Ain	53 363	2 850	269
Allier	66	2	1
Ardèche	275	36	5
Cantal	175	8	4
Drôme	9 336	411	56
Isère	36 340	2 105	136
Loire	2 126	131	21
Haute-Loire	121	85	12
Puy-de-Dôme	2 240	106	38
Rhône	89 959	5 429	174
Savoie	31 859	1 089	143
Haute-Savoie	6 601	651	80
Total	232 461	12 903	939

**Attractivité
moyenne : 2,0 FA
par piège et par
semaine.**

**Sélectivité moyenne
: 66 % de FA.**

Date et durée du piégeage



Durée moyenne de piégeage : 71 jours



Préconisations régionales :



Date moyenne de fin de piégeage : 26/05/2026



Il faut arrêter le piégeage quand trop de fondatrices de frelons européens sont capturées. 88 604 individus ont été piégés sur la campagne.


Cette année, elles ont émergé précocement de leur diapause hivernale.



Date moyenne de début de piégeage : 17/03/2026



Nombre de captures par département



Plus de 232 000 fondatrices capturées, soit presque le double qu'en 2025 (128 000).


Le nombre de pièges a augmenté moins fortement, il y a eu 1,3 fois plus qu'en 2025 (9 600).

Le piégeage de printemps dépend fortement de la mobilisation locale.

Nombre de captures par commune


**Une lutte à harmoniser :
des captures enregistrées
sur 939 communes
(parmi les 4185 de la
région).**

Afin que le piégeage soit
efficace, il doit être collectif.



Les pièges

Modèles utilisés



Une majorité de modèles recommandés par le plan national (pièges Beevital et Osaka).

En 2025, ils étaient 41 %.

De moins en moins de pièges bouteilles (8 % en 2025). Ces derniers étant à proscrire, ils ne figureront pas dans les résultats suivants.


Les pièges

Attractivité

Le piège BeeVital est significativement plus attractif que les autres modèles.


Le piégeage de printemps demande du temps et son efficacité reste débattue. Il doit donc être optimisé au maximum.

2,6 FA par semaine en moyenne, pour la deuxième année de suite



Les pièges

Sélectivité



1,2 insectes non cibles ont été recensés par piège en moyenne (hors frelons européens).

Ces résultats contredisent ceux de la littérature scientifique et ne permettent pas d'interprétation.



Les appâts


Mélanges utilisés

Une écrasante majorité du mélange bière + sirop + vin blanc.

D'autres appâts se révèlent néanmoins efficaces.


Les appâts commerciaux sont généralement plus onéreux.

Types d'appâts utilisés



Les appâts

Attractivité



**Moins de différences
que pour les modèles
de pièges.**

Tous ces appâts sont jugés
suffisamment attractifs.

L'appât doit être changé
tous les 8-10 jours
(3-4 en cas de fortes
températures).

Merci à toutes et tous pour votre implication dans la lutte



	• Des déclarations non réalisées avant la clôture du formulaire • Des comptages d'insectes non cibles perfectibles • Un piégeage trop tardif pour 2026
	• De plus en plus de fondatrices capturées • De plus en plus de pièges recommandés par le plan national • De moins en moins de pièges bouteilles